

តើធ្វើដូចម្តេចទើបខ្ញុំដឹងថា

ការបំបៅដោះ

មានដំណើរការល្អ?

(How can I tell that breastfeeding is going well?)

ប្រសិនបើអ្នកឃើញមានសញ្ញាគូសនៅខាងស្តាំដៃ (ខាងក្រហម) សូមនិយាយជាមួយធូប ឬគិលានុបដ្ឋាក ផ្នែកសុខភាពកុមារ និងគ្រួសារ ដើម្បីមានការធានាទំនុកចិត្ត ឬសុំជំនួយអំពីការបំបៅរបស់ទារកអ្នក។

វាជាការប្រសើរសម្រាប់ទារករបស់អ្នក និងអ្នកដែលទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញចាប់តាំងពីគ្រាដំបូង។






😊 ការបំបៅដោះមានដំណើរការល្អ ពេលណា៖	☹️ សូមនិយាយជាមួយធូប ឬគិលានុបដ្ឋាកផ្នែកសុខភាពកុមារ និងគ្រួសាររបស់អ្នក ប្រសិនបើ៖
ទារករបស់អ្នកបានបំបៅ 8 ដង ឬច្រើនជាងនេះ ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង	ទារករបស់អ្នកចេះតែងងុយគេង ហើយបានបំបៅតិចជាង 6 ដង ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង
ទារករបស់អ្នកបំបៅបានរវាង 5 ទៅ 40 នាទី នៅរាល់ការបំបៅម្តងៗ	ទារករបស់អ្នកបំបៅបានតែរយៈពេល 5 នាទី ឬតិចជាងនេះ នៅរាល់ការបំបៅម្តងៗយ៉ាងជាប់លាប់ ទារករបស់អ្នកបំបៅបានតែរយៈពេលយូរជាង 40 នាទី នៅរាល់ការបំបៅម្តងៗយ៉ាងជាប់លាប់ ទារករបស់អ្នកចេះតែងងុយគេងនៅពេលបំបៅនឹងដោះ ហើយ/ឬមិនដែលបញ្ចប់ការបំបៅដោយខ្លួនឯង
ទារករបស់អ្នកមានពណ៌សម្បុរស្បែកធម្មតា	ទារករបស់អ្នកហាក់បីដូចជាមានជម្ងឺខាន់លឿង (ស្បែកប្រៃទៅជាពណ៌លឿង) ជាធម្មតា វាចាប់ផ្តើមនៅលើមុខទារក ហើយបន្ទាប់មករាលដាលដល់រាងកាយ ដៃ និងជើង។ សូមអញ្ជើញទៅគ្លីនិកសុខភាពកុមារ និងគ្រួសាររបស់អ្នក ដែលទ្រទ្រង់ការបំបៅដោះ ឬវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យរោគទូទៅរបស់អ្នក ប្រសិនបើបញ្ហានេះកាន់តែកើនឡើង ហើយ/ឬកូនរបស់អ្នកចេះតែងងុយគេង
ជាទូទៅ ទារករបស់អ្នកស្ងប់ស្ងាត់ ហើយបន្តប្រាណ ខណៈពេលកំពុងបំបៅ ហើយភាគច្រើនឆ្អែតស្ងប់ស្ងួលបន្ទាប់ពីការបំបៅ	ទារករបស់អ្នកបំបៅ រួចហើយខ្ញាក់ចេញពីដោះជាញឹកញាប់ក្នុងអំឡុងពេលបំបៅ ឬប្រកែកមិនព្រមបំបៅដោះ
ទារករបស់អ្នកមាននោម ហើយដុះដាក់កន្ទប (សូមមើលតារាងនៅទំព័រម្ខាងទៀត)	ទារករបស់អ្នកមិននោម ហើយមិនដុះដាក់កន្ទប (សូមមើលការពន្យល់នៅទំព័រម្ខាងទៀត)
ការបំបៅដោះមានភាពសុខស្រួល	អ្នកកំពុងឈឺដោះ ឬក្បាលដោះរបស់អ្នក មិនបានធូរស្បើយ បន្ទាប់ពីទារកជញ្ជក់បានពីរបីដងដំបូង។ ក្បាលដោះរបស់អ្នកបួតចេញពីមាត់ទារក ហើយមើលទៅហាក់បីដូចត្រូវគាបខ្លឹម ឬឡើងសំបែតនៅពីម្ខាង
ដោះរបស់អ្នកមានសភាពទន់ជ្រាយច្រើន បន្ទាប់ពីការបំបៅ	ដោះរបស់អ្នកមិនមានសភាពទន់ ឬវាមានកកដុះនៅខាងក្នុង ឬពណ៌ក្រហមក្រោយពេលបំបៅ
នៅពេលទារករបស់អ្នកមានអាយុ 3-4 ថ្ងៃ និងលើសពីនេះ អ្នកគួរតែអាចឮសូរទារករបស់អ្នកលេបបានញឹកញាប់ ក្នុងពេលបំបៅ	អ្នកមិនអាចប្រាប់បានថាទារករបស់អ្នកកំពុងលេបទឹកដោះ នៅពេលទារករបស់អ្នកអាយុ 3-4 ថ្ងៃ ឬលើសពីនេះ អ្នកគិតថាទារករបស់អ្នកត្រូវការក្បាលដោះដំរី អ្នកមានអារម្មណ៍ថា អ្នកត្រូវការផ្តល់ម្សៅទឹកដោះគោឱ្យទារករបស់អ្នក

យកលំនាំតាមដោយមានការអនុញ្ញាតពី គំនិតផ្តួចផ្តើមសុខភាពមិត្តភាពទារក UNICEF (UNICEF Baby Friendly Health Initiative) ដោយក្រុមអ្នកចាប់អារម្មណ៍ការបំបៅកូននឹងដោះ SLHD (SLHD Breastfeeding Interest Group) ជាមួយនឹងការពិគ្រោះយោបល់របស់អតិថិជន។ ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយក្រុមគ្រួសារដែលទទួលសេវាកម្មសុខភាពកុមារ និងគ្រួសារ SLHD - ឆ្នាំ 2017 5/03/18 2:18 PM

តើធ្វើដូចម្តេចទើបខ្ញុំដឹងថាការបំបៅដោះមានដំណើរការល្អ?

តើធ្វើដូចម្តេចទើបខ្ញុំដឹងថា ទារករបស់ខ្ញុំបានបំបៅគ្រប់គ្រាន់? (How do I know my baby is getting enough?)

អ្វីៗក្នុងកន្ទបរបស់ទារកអ្នកនឹងផ្លាស់ប្តូរ ក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ដំបូង។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះនឹងជួយអ្នកឱ្យបានដឹង ថាតើការបំបៅមានដំណើរការល្អឬអត់។ សូមនិយាយជាមួយធូប ឬគិលានុបដ្ឋាក ផ្នែកសុខភាពកុមារ និងគ្រួសាររបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានកង្វល់ណាមួយ។ សូមគូសសញ្ញាក្នុងជួរឈរ។

អាយុរបស់ទារក	កន្ទបសើម	កន្ទបកខ្វក់	តើ 'លាមក' នេះ មើលទៅ មានលក្ខណៈដូចម្តេចដែរ?
អាយុ 1-2 ថ្ងៃ	1-2 ឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយថ្ងៃ អ៊ុយរ៉ាត (urates) អាចនៅមានរហូតដល់ថ្ងៃទី 4* (សូមមើលការពន្យល់ខាងក្រោម)	1 ឬច្រើនជាងនេះ 'ដូចជើរស្អិត' ពណ៌បៃតងក្រមៅ/ឬខ្មៅ ដែលគេហៅថា <i>លាមកព្រៃរបស់ទារកទើបកើត</i>	
អាយុ 3-4 ថ្ងៃ	3 ឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយថ្ងៃ។ កន្ទបស្នាបមើលទៅហាក់បីដូចជា ធ្នង់ជាងធម្មតា។ ទារកស្រីខ្លះ ចេញដំណើរមានរដូវមិនពិត ដែលជារឿងធម្មតាទេ** (សូមមើលការពន្យល់ខាងក្រោម)	ការផ្លាស់ប្តូរពណ៌ និងមានភាពស្អិតស្អុយ - ពណ៌បៃតង/ត្នោត/លឿង មានសភាពកាន់តែទន់ ('ផ្លាស់ប្តូរលាមក')	
អាយុ 5-6 ថ្ងៃ	5 ឬច្រើនជាងនេះ សើមធ្នង់ ជាញឹកញាប់ ជាមួយនឹងកន្ទបដែលប្រើរួចបោះចោល វាពិបាកនឹង ប្រាប់ថាកន្ទបសើមឬក៏អត់។ ដូច្នេះដើម្បីឱ្យបានដឹងថាតើមាន ទឹកនោមគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អត់ ចូរយកកន្ទបមួយ ហើយចាក់ទឹក បន្ថែម 2-4 ស្លាបព្រាបាយ។ នេះនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវគំនិតដើម្បី ស្វែងរក/ស្នាបមើល។	យ៉ាងហោចណាស់ 2 ពណ៌លឿង អាចទទឹកជោគ	
អាយុ 7-28 ថ្ងៃ	6 ឬច្រើនជាងនេះ ហើយសើមធ្នង់	យ៉ាងហោចណាស់ 2 យ៉ាងហោចណាស់មានទំហំប៉ុនកាក់ 50 សេន ពណ៌លឿង ហើយជាញឹកញាប់ទទឹកជោគ មើលទៅ 'គ្រាប់ៗ'	
អ៊ុយរ៉ាត (urates)*	អ៊ុយរ៉ាត គឺជាសារធាតុពណ៌ទឹកក្រូច/ក្រហមក្រមៅ ដែលទារកជាច្រើនជុះចេញមកក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃដំបូង។ នៅអាយុនេះ ពួកគេមិនជាបញ្ហាទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើវាកើតមានរយៈពេលលើសពីពីរថ្ងៃដំបូង អ្នកគួរតែប្រាប់ធូប/គិលានុបដ្ឋាកសុខភាពកុមារ និងគ្រួសាររបស់អ្នក ដោយព្រោះថានេះអាចជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថា ទារករបស់អ្នកមិនបានបំបៅទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់។		
ដំណើរមានរដូវ មិនពិត**	ដំណើរមានរដូវមិនពិត ក្នុងសប្តាហ៍ដំបូង គឺការហូរចេញទឹកអ៊ុយរ៉ាតដែលមានឈាមពណ៌ព្រឿងៗចេញពីទ្វារមាស ដោយសារតែការដកចេញនៃ អ័រម៉ូនរបស់ម្តាយក្រោយពេលសម្រាលកូន។ វាជារឿងធម្មតាទេ។		

យកលំនាំតាមដោយមានការអនុញ្ញាតពី គំនិតផ្តួចផ្តើមសុខភាពមិត្តភាពទារក UNICEF (UNICEF Baby Friendly Health Initiative) ដោយក្រុមអ្នកចាប់អារម្មណ៍
ការបំបៅកូននឹងដោះ SLHD (SLHD Breastfeeding Interest Group) ជាមួយនឹងការពិគ្រោះយោបល់របស់អតិថិជន។

Created: January 2018
Review by: January 2020
AVS 83586